

# 



STATION  
POITOU-CHARENTES

BIBLN  
06303 03003 00097 3071A 11/03/92-15h N  
BIBLIOTHEQUE NATIONALE  
REGIE DEPOT LEGAL  
PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE  
58, RUE RICHELIEU

75000 PARIS

Bulletin n°214-2 (04/92) du 11 Mars 1992

**BLE** : Message concernant uniquement les parcelles levées avant le 5 Novembre 1991  
**POIS** : Surveiller les sitones

## BLE

### PIETIN VERSE

#### Situation

Des symptômes de piétin-verse sont observés sur les semis les plus précoces présentant des précédents blé, dans les sols à risques. Sur ces parcelles, l'explosion de la maladie ne dépend plus maintenant que de l'arrivée des premières pluies.

#### Préconisation

- Parcelles à risque piétin-verse très élevés, (note supérieure à 15) avec une levée avant le 5 Novembre 1991 :

Intervenir avec un produit spécifique piétin placé juste avant les pluies contaminatrices (fin de la semaine selon météo-france).

- Autres types de parcelles :

Attendre les prochains bulletins pour intervenir (préconisations pour le premier traitement).

## COLZA

Stade D1 (boutons accolés encore cachés) à E (boutons séparés).

### CHARANCON DE LA TIGE

#### Situation

Le vol se poursuit. On remarque une diminution logique des captures : des piqûres de ponte sont observables dans les parcelles non protégées.

#### Préconisation

Dans les parcelles non traitées, il est trop tard pour intervenir. Dans les parcelles traitées fin

février début Mars (d'après nos préconisations), la protection va encore être effective jusqu'au 15-20 Mars. Il ne sera pas nécessaire de renouveler le traitement.

### MELIGETHES

#### Situation

Le vol a débuté. Les premiers jours de Mars et les captures se sont intensifiées rapidement. Vos cultures sont encore protégées par le biais de votre traitement charançons qui a une rémanence d'environ 3 semaines.

#### Préconisation

A partir du 15-20 Mars, surveillez vos cultures et réalisez un traitement si vous observez :

- 1 méligèthe par inflorescence au stade D1-D2 ;
- 2 méligèthes par inflorescence au stade E.

## POIS

Stade levée à 2 feuilles.

### SITONE

#### Situation

L'activité est déjà importante sur la région et l'on constate de nombreuses morsures d'adultes, sur les folioles des premières feuilles (Charente et Charente-Maritime). Compte tenu de la précocité de l'attaque, le risque est élevé.

#### Préconisation

Surveillez vos pois dès le stade 1 feuille. Intervenez dès que vous avez entre 5 et 10 morsures en moyenne sur l'ensemble des folioles de la première feuille ou (sur les stipules pour les types afila).



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD  
Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique  
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL  
CPPAP no. 1664 A.D.  
ISSN 0294 - 4693

77